



Exklusiver Vertrieb in Deutschland
über die **Claus GmbH**



TROPICAN®

Hand-Feeding Formula

Handaufzucht-Futter für Papageien

- ✓ Premium-Futter für die tägliche Fütterung von Jungvögeln
- ✓ Feines Extrudat (Pulver) mit speziell abgestimmter Rezeptur
- ✓ Einfache Zubereitung mit warmem Wasser
- ✓ Optimale Zusammensetzung von Proteinen und Nährstoffen für gutes Wachstum



Empfohlen für:

Graupapageien • Amazonen • Nymphensittiche • Kakadus • Sittiche • Edelpapageien • Agaporniden • Aras • Rotsteiþpapageien und die meisten anderen Arten

TROPICAN *Hand Feeding Formula* ist ein artgerechtes Spezialfutter (in Pulverform) in optimaler Zusammensetzung für die erfolgreiche Handaufzucht von Papageienbabys.

Alleinfuttermittel für Papageien

Zusammensetzung:

Getreide 70% (Mais, Weizen, brauner Reis und Hafergrütze), pflanzliche Nebenerzeugnisse, Saaten 3,5% (Leinsamen 1%), Mineralstoffe, Nüsse (Erdnüsse 3,8%), Öle und Fette, Hefen.

Fütterungsempfehlung:

Mischen Sie die richtige Menge TROPICAN *Hand-Feeding Formula* (siehe Tabelle) mit heißem Wasser. Alternativ können Sie auch kaltes Wasser und eine Mikrowelle benutzen. Zur Fütterung ist eine Spritze empfehlenswert (sofern der Umgang damit vertraut ist). Für weitere Informationen zu Zubereitung und Fütterung s. **Rückseite**.

Das Futter aus hygienischen Gründen immer täglich vor jedem Füttern frisch anmischen und die Mengeneinheiten und Verhältnisse von Futter und Wasser bitte genau beachten.

Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe pro kg:

Vitamin A 8.250 IU, Vitamin D₃ 660 IU, Jod (3b202) 1,1 mg, Kupfer (3b405) 13,2 mg, Mangan (3b502) 140 mg, Zink (3b603) 176 mg, Selen (E 8) 0,4 mg

Analytische Bestandteile

| | | | |
|-------------------|------|-------------------------|------------|
| Rohprotein..... | 22% | Beta-Carotin..... | 0,42 mg/kg |
| Rohfett..... | 11% | Omega-3-Fettsäuren..... | 0,03% |
| Rohfaser..... | 3,5% | Omega-6-Fettsäuren..... | 0,25% |
| Wassergehalt..... | 9% | | |
| Calcium..... | 1% | | |
| Phosphor..... | 0,8% | | |

Zubereitung:

| ZUBEREITUNG VOGEL-ALTER (Tage) | ANTEIL WASSER / TROCKENFUTTER | TEMPERATUR BRUTGERÄT °Celsius |
|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 0 - 2 | 90% / 10% | 35,5 - 36,5 |
| 3 - 7 | 85% / 15% | 33,5 - 34,5 |
| 7 - 21 | 80% / 20% | 30,0 - 32,5 |
| 21 | 75% / 25% | 27,0 - 30,5 |



**SORGFÄLTIG GETESTET
AUF AFLATOXINE UND
SCHIMMELPILZE**



**VERPACKT UNTER
SCHUTZATMOSPHERE**



**EMPFIHLT
HARI**

Weitere Informationen finden Sie auf:

www.hari-futter.de

Als Ergänzungsfuttermittel:

**Geeignet für Loris, Finken, Kanarien
und andere kleine Arten.**

Loris:

Füllen Sie einfach das trockene Pulver in eine Schale. Zusätzlich können Sie in einer 2. Schale geschnittene Früchte mit PRIME und TROPICAN *Hand-Feeding* mischen. Stellen Sie jedoch sicher, dass zuerst nur das trockene Pulver verzehrt wird. Außerdem darf das trockene Pulver nicht vermischt werden.

Finken, Kanarien und andere kleine Arten:

Das Pulver in einer separaten Schale bei Stress, Mauser und Brutzeit anbieten.

Abpackungsgrößen

| | |
|-------|-------|
| B2259 | 400 g |
| B2263 | 2 kg |
| B2262 | 5 kg |



**EINFACHE
ZUBEREITUNG
MIT WASSER**



**HOHE
KALORIEN-
DICHTE**



**OPTIMALE
PROTEIN-
VERSORGUNG**

**GETREIDEMIX
+ ERDNUSS-
MUS**





Exklusiver Vertrieb in Deutschland
über die **Claus GmbH**

TROPICAN®

Hand-Feeding Formula



Futterzubereitung:

Vermischen Sie das Futter immer vollständig und achten Sie auf durchgängig gleiche Futtertemperatur. Durch die hervorragenden Gelierungseigenschaften von TROPICAN *Hand Feeding Formula* dauert es ca. eine Minute, bis das Futter vollständig mit Wasser angefeuchtet ist. Aus diesem Grund ist eine Feinabstimmung der Konsistenz empfehlenswert. Geben Sie gegebenenfalls ein bisschen mehr Wasser hinzu. Die endgültige Temperatur sollte etwas über der Körpertemperatur liegen (38°C), darf aber 40,5°C nicht übersteigen.

TIPP:

Es sollte immer ein präzises, kalibriertes Thermometer verwendet werden, um die gewünschte Temperatur zu überprüfen. Zu heißes Futter kann Verbrennungen am sensiblen Schlund- und Kropfgewebe verursachen.

Die empfohlene Brutgerät-Temperatur (**s. Tabelle, S. 1/Vorderseite**) sollte als Leitfaden dienen, um Küken bei der richtigen Temperatur zu halten.

Das TROPICAN *Hand-Feeding Formula* ist ein Alleinfuttermittel. Vermischen Sie es nicht mit anderen Futtersorten für Jungvögel, da sonst wichtige Nährstoffe aus der ausgewogenen Rezeptur nicht mehr ausreichend zur Verfügung stehen könnten.

Fütterungsempfehlung:

Eine Fütterung mit einer Futterspritze ist empfehlenswert, vorausgesetzt, Sie sind sicher mit deren Umgang und Sie verwenden für jedes Gelege eine neue Spritze. Platzieren Sie die Spritze mit einer Hand in der linken Hälfte des Schnabels. Die Handfläche der anderen Hand sollte hinter den Kopf des Kükens gelegt und mit den Fingern sollte Druck auf die beiden Außenwinkel des Schnabels ausgeübt werden. So können Sie verhindern, dass die Spritze den Schlund verletzt, wenn das Küken auf das Futter reagiert. Wenn der Vogel auf die Futterspritze reagiert (Pumpbewegung des Kropfes), beginnen Sie mit der Fütterung und zielen Sie mit dem Futter in die hintere, rechte Seite des Mundes. Wenn Sie mit dem Umgang einer Futterspritze nicht vertraut sind, können Sie auch einen Löffel verwenden, der auf beiden Seiten gebogen ist.

Achten Sie genau auf die Reaktion und die Atmung des Kükens, um ein Verschlucken zu verhindern. Befüllen Sie den Kropf, ohne ihn übermäßig zu strecken. Für ein gesundes Wachstum sollten Sie täglich das Gewicht und die Futtermenge notieren. Achten Sie darauf, dass sich der Kropf zwischen den Fütterungen vollständig entleert. Ein gebogener Teelöffel kann ebenfalls verwendet werden, um Futter langsam in den Schnabel tropfen zu lassen. Kropfkanülen aus Metall sind nicht empfehlenswert, da sie den Kropf und die Speiseröhre durchbohren können, sodass Futter austreten kann.

Loris, Finken, Kanarienvögel und andere kleine Vogelarten können mit diesem Futter als Ergänzungsfuttermittel in trockener Form gefüttert werden.

Wichtige Hinweise:

Bereiten Sie bei jeder Fütterung eine frische Portion zu, verwenden Sie immer sauberes Besteck und messen Sie die Mengen genau ab. Beachten Sie dabei die Werte der Tabelle auf der Vorderseite /S.1.

